

Studien fachfremder Arbeitsgruppen zur hausärztlichen Versorgung Stand vom Juni 2006

Studienname	Status/ Veröffentlichung	Erkrankung/ Versorgungsaspekt	Arbeitsgruppe/ Sponsor	Ergebnis
Depressionsstudie 1999	Abgeschlossen/ veröffentlicht ¹	Depression	Wittchen et al./ SmithKline	Hohe Praxisprävalenz Depression, schlechte hausärztl. Erkennungs- und Behandlungsrate
Depression study 2000	Abgeschlossen/ veröffentlicht ²	Depression	Wittchen, Pittrow et al./ Organon	Hohe Praxisprävalenz Depression, schlechte hausärztl. Erkennungs- und Behandlungsrate
GAD-P	Abgeschlossen/ veröffentlicht ³	Angststörung	Wittchen et al./ Wyeth Pharm.	Hohe Praxisprävalenz Angststörung, schlechte hausärztl. Erkennungs- und Behandlungsrate
HYDRA 2003	Abgeschlossen/ veröffentlicht ^{4 5}	Hypertonie und Diabetes	Wittchen, Pittrow et al./ Sanofi Synthelabo	Hohe Praxisprävalenz Hypertonie, schlechte hausärztl. Versorgung
SNICAS 2003	Abgeschlossen/ veröffentlicht ⁶	Nikotin	Wittchen et al. / GSK	Hohe Praxisprävalenz Raucher, schlechte hausärztl. Erkennungs- und Behandlungsrate
NISAS 2003	Abgeschlossen/ veröffentlicht ⁷	Schlafstörungen	Wittchen, Pittrow et al./ Sanofi Synthelabo	Hohe Praxisprävalenz Schlafstörungen, schlechte hausärztl. Erkennungs- und Behandlungsrate
	Abgeschlossen/ veröffentlicht ⁸	Depression	Schneider er al./ BMBF	schlechte hausärztl. Erkennungs- und Behandlungsrate, schlechte Leitlinienkonformität*
getABI	Abgeschlossen/ veröffentlicht ^{9 10}	pAVK	Diehm ¹ & Pittrow/ Sanofi Synthelabo	Hohe Praxisprävalenz pAVK, schlechte hausärztl. Erkennungs- und Behandlungsrate
	Abgeschlossen/ veröffentlicht ¹¹	Demenz	Melchinger et al. / BMBF	schlechte hausärztl. Behandlungsrate, schlechte Leitlinienkonformität*
COBRA	1. Phase abgeschlossen, 2. Phase noch in der Erhebung	Ambulante Opiat-Substitution	Wittchen et al./ ASAT/ BMBF	Noch in der Erhebungsphase: Versorgungssituation in der ambulanten Substitution
DETECT	1. Phase abgeschlossen, 2. Phase noch in der Erhebung	Hypertonie, Diabetes, Dislipidämien	Wittchen et al./ Pfizer	KHK und Diabetes in hausärztlicher Versorgung
PACE-PAD	In der Erhebungsphase	pAVK	Wasem ² et al./ Sanofi Synthelabo	pAVK in hausärztlicher Versorgung

*fachärztliche Leitlinien noch in Erhebungsphase abgeschlossen und veröffentlicht

¹ Mitglied des Steering-Komitees der PACE-PAD-Studie

² Mitglied des Steering-Komitees der COBRA-Studie

Literatur:

- ¹Wittchen HU, Höfler M, Meister W. Prevalence and recognition of depressive syndroms in German primary care settings: poorly recognized and treated? *Inter Clin Psychopharmacol* 2001, 16:121-35
- ²Wittchen HU, Pittrow D. Prevalence, recognition and management of depression in primary care in Germany: the depression 2000 study. *Hum Psychopharmacol Clin Exp* 2002; 17: S1-S11
- ³Wittchen HU, Kessler RC, Beesdo K, Krause P, Höfler M, Hoyer J. Generalized Anxiety and Depression in Primary Care: Prevalence, Recognition and management. *J Clin Psychiatry* 2002, 63 (8): 24-34
- ⁴Wittchen HU, Krause P, Höfler M, Pfister , et al. Hydra-Studie. *Fortschritte der Medizin* 2003, Sonderheft I
- ⁵ Lehnert M, Wittchen HU, Pittrow D, Bramlage P, Kirch W, Böhler S, Höfler M, Ritz E. Prävalenz und Pharmakotherapie. Des Diabetes mellitus in der primärärztlichen Versorgung. *DMW* 2005; 130: 323-28
- ⁶Wittchen, H-U, Sonntag, H., Nowak, D., Kröger, C., Schmidt, L.G. Raucherentwöhnung beim Hausarzt – Illusion oder Perspektive? *Der Hausarzt* 2002; 6: 49-53.
- ⁷ Wittchen, H.-U., Krause P., Höfler M., Winter S., Spiegel B., Hajak G., Riemann D., Pittrow D., Steiger A. & Pfister H.. NISAS-2000 – die „Nationale Insomnie Awareness und Screening Studie“. *Insomnien und Schlafstörungen in der allgemeinärztlichen Versorgung. Nervenheilkunde* 2001; 20(1): 4-16.
- ⁸ Schneider F, Kratz S, Bermejo I, Menke R, Mulert C, Hegerl U, Berger M, Gaebel W, Härter M. Insufficient depression treatment in outpatient settings. *German Medical Science* 2004; 2: 2
- ⁹ Lange S, Diehm C, Darius H, Haberl R, Allenberg JR, Pittrow D, Schuster A, von Stritzky B, Tepohl G, Trampisch HJ. High prevalence of peripheral arterial disease and low treatment rates in elderly primary care patients with diabetes. *Exp Clin Endocrinol Diabetes*. 2004; 112(10):566-73
- ¹⁰ Pittrow D, Lange S, Trampisch H et al.: The German trial on ankle brachial index (getABI): high prevalence and evidence for antiplatelet undertreatment of peripheral arterial disease in primary care. *Int J Clin Pharmacol Ther* 2003; 41(445 (P27)).
- ¹¹ Melchinger H, Machleidt W. Werden Demenzpatienten in Hausarztpraxen lege artis behandelt? *Z Allg Med* 2005; 81: 191-96